

ALERTE AU JARDIN



fin juin
2020

Un jardinier averti en vaut deux


BY adalía:

Les limaces rôdent autour de vos laitues ?
Les pucerons pullulent sur vos rosiers ?
Les chenilles grignotent vos buis ?
Soyez prévenus et informés grâce à l'avertissement d'Adalia 2.0. Des conseils écologiques vous sont envoyés à temps pour limiter les dégâts et préserver l'environnement.

Ça y est, l'été est là ! On pense aux vacances et aux sorties entre amis. Mais n'oubliez pas le jardin ! Heureusement, on peut compter sur l'aide des insectes auxiliaires qui veillent au grain. Cela ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à craindre car les pucerons, chenilles et autres indésirables sont toujours en nombre et peuvent parfois envahir toute une plante. Soyez vigilants et, surtout, profitez du temps estival !

AU JARDIN ORNEMENTAL

- Les larves de **tenthrede** (qui ressemblent à des chenilles sur la photo ci-contre) vivent en colonie. Il est fréquent d'en voir des dizaines sur le pourtour des feuilles de rosier ou sur les arbustes. Une attaque de ce ravageur affaiblit la plante sans toutefois provoquer sa mort. La méthode la plus simple consiste à retirer les chenilles à la main. En cas de fortes attaques, vous pouvez envisager un traitement à base de **spinosad**² (insecticide à faible impact) en dehors des périodes de vols des insectes pollinisateurs. **Évitez les produits insecticides** à base de **pyréthrine**s associés au **piperonyl butoxyde** car ce synergiste est toxique pour la santé et l'environnement.
- Surveillez les **pucerons** dans tous les secteurs du jardin, notamment sur les rosiers. En l'absence de larves dévoreuses de pucerons (syrphes, coccinelles, chrysopes...), intervenez au moyen d'un jet d'eau afin de déstabiliser la colonie. Quand il s'agit d'une attaque localisée sur l'extrémité des jeunes tiges, coupez simplement la partie infestée. Un traitement au **purin d'orties**¹ (**macération de 2 à 3 jours**) contre les pucerons et acariens serait efficace sur les plantes les plus sensibles.



AU POTAGER

- Les papillons de **piérides** et **noctuelles** sont actifs et commencent à pondre sur les choux. Installez un voile anti-insectes sur les plantes à risques. Cela servira également à prévenir de l'attaque des altises qui sont favorisés par temps sec. Regardez sous les feuilles afin de repérer les chenilles (voir photo ci-contre) déjà présentes et écrasez-les.
- De nombreux légumes (laitues, courges, choux,...) ont été infestés par des **pucerons** ces dernières semaines. Les fortes pluies vont en revanche être défavorables au puceron. Les populations devraient donc se stabiliser, voire diminuer. De plus, les **auxiliaires** (larves de syrphes et de coccinelles, cantharides,...) régulièrement observés sur les salades vont permettre de gérer les populations. Surveillez vos parcelles et la présence de ces auxiliaires très actifs contre les pucerons.



AU VERGER

- Placez des **bandes de carton** sur le tronc des pommiers pour piéger le **carpocapse** (ver de la pomme). Une bande de carton alvéolé d'environ 15 cm de largeur est placée autour de l'arbre à une trentaine de centimètres du sol. La bande doit être placée courant juin (mi-juillet au plus tard). Les larves vont venir se loger dans les alvéoles pour se nymphoser. A la mi-octobre (mi-novembre), retirez les bandes et brûlez-les.
- Si vous n'avez pas encore placé un **pièges à phéromones**¹, il n'est pas trop tard. Les vols de papillons carpocapses peuvent se prolonger jusqu'au mois de juillet sur les arbres ayant été infestés l'année passée.
- **Binez et sarclez** la terre pour supprimer les mauvaises herbes au pied des jeunes arbres et arbustes et profitez-en pour y apporter un **paillage**¹. Une couche d'au moins 7 cm est idéale pour empêcher les pousses d'adventices de lever.
- Beaucoup de **petits fruits** sont à maturité (fraises, groseilles, cerises, framboises,...) ce mois-ci. Si vous ne voulez pas vous contenter des restes, protégez-les petits fruits des oiseaux avec un **filet**¹ suffisamment grand.



RAPPEL : PYRALE DU BUIS

Les papillons de la **pyrale du buis** (surtout visibles la nuit) ont débuté leur vol au début de ce mois de juin : installez sans tarder un **pièges à phéromones**¹. Manipulez avec soin la capsule ou le gel contenant les phéromones. Pensez à renouveler les phéromones après 6 semaines tant que vous piègez des papillons.



NB: ¹Les techniques en vert sont des moyens alternatifs aux produits pesticides (pièges, auxiliaires,...).
²Les produits en orange sont des pesticides d'origine organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et l'environnement. Utilisez ces produits avec toutes les précautions nécessaires et en dehors des périodes de vols des insectes auxiliaires et autres pollinisateurs.

Crédits photos: Papillon de pyrale du buis: CORDER asbl

Rédaction: Adalia 2.0 asbl

Collaboration: Centre d'Essais Horticoles de Wallonie

Source complémentaire: Les Bulletins de santé du végétal du Hauts-de-France

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS AVERTISSEMENTS

Abonnez-vous afin de recevoir les **Alertes au jardin par courriel**
en envoyant «**alerte**» à **bastien@adalia.be**



BY adalia:

Des jardinereries s'engagent en faveur des alternatives aux pesticides !
Le label «Jardiner Sans Pesticides» est un gage de qualité pour le jardinier et une reconnaissance pour les enseignes qui se mobilisent en faveur d'un jardin sans pesticides.

Retrouvez-les sur www.jardiniersanspesticides.be